

ODUN DIŐI ORMAN ÜRÜNLERİ



LIQUIDAMBAR ORIENTALIS
ANADOLU SIĞLA AĞACI



Muğla



**BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ GENELİNDE
PORSUK-REZENE-SAFRAN-SIĞLA YAĞI DAĞILIMINI GÖSTEREN HARİTA**



Forest




Tarihteki Önem

Kleopatra aşk
iksiri ve
parfüm olarak
kullanmıştır



Hipokrat

döneminden beri
ilaç olarak
kullanılmıştır.




Eski Mısırlılar sığla
yağını mumyalama
işlemleri sırasında
kullanmışlardır





Kuru yongaları çeşitli ayinlerde tütsü olarak kullanıldığından ağaca "günlük ağacı" denir





**Gövdelerinde açılan yaralar sonucu elde edilen
“Sığla Yağı” en önemli ürünüdür.**

- 
- Yağ, [antiseptik](#) özelliğe sahiptir.
 - [Parazitlere](#) karşı etkilidir.
 - Ciltte yumuşatıcı, rahatlatıcı, iltihap giderici ve yara iyi edici etkileri bulunmaktadır.
 - Halk tarafından özellikle mide rahatsızlıklarında ve yaraların iyileştirilmesinde kullanılmaktadır.
 - Aynı zamanda temizleyici ve ter kokularını giderici olarak da kullanılır.
 - Parfümeride sabitleyici (fiksator) olarak kullanılmaktadır. Yani parfüm içerisindeki güzel kokuların uçmamasını sağlar.
 - Sığla yağıyla yapılan sabunlar cilt yumuşatıcı etkiye ve güzel kokuya sahiptir.



ALCHEMILLA L. (Aslanpençesi, Dokuztepe, Fındık Otu)

Alchemilla caucasica

Alchemilla epipsila

Alchemilla pseudocartalinica



Türkiye'de 73 türü bulunmaktadır.

Çoğunlukla Kuzey Anadolu Bölgesi'nde yayılış gösterir.

Apomiktik bir bitkidir.



ALCHEMILLA L. (Aslanpençesi, Dokuztepe, Fındık Otu)

Çok yıllık rizomlu bitkilerdir . *Alchemilla* türleri sert kayalar, kumlu topraklar, değişik nemli topraklarda, çimenlerde, çalı ve orman vejetasyonu içerisinde, geniş ekolojik ve coğrafik yayılışa sahiptirler.



Bitki;

Yararlı ot salatasında

Akne tedavisinde,

Kremlerde

Ağız gargarası, ishalin tedavisinde, yara iyileştirmede,


Kanama ve sindirim sistemi rahatsızlıklarında,

Kimi kadın hastalıklarında,

Şişmanlığı önlemede, şeker hastalığında,

Göz rahatsızlıklarında kullanılmaktadır.

Kaya ve çatı bahçeleri yapımında



Equisetum arvense (Atkuyruđu)

Kirkkilit otu, Katirkuyruđu, Zemberek otu, Kirkboğum

Kullanılan Kısımları ve İçerikleri: Kurutulmuş verimsiz dalları kullanılır.

Kullanım Şekilleri ve Alanları : İnfüzyon halinde kullanılır. İdrar söktürücü, taş ve kum düşürücü, iç kanamaları (mide kanaması) durdurucu ve yara iyi edici etkileri vardır. Haricen yaraların yıkanması ve temizlenmesinde kullanılır. Genç sürgünleri yiyen hayvanlarda özellikle sığır ve atlarda kan işemesi şeklinde beliren zehirlenmelere neden olur. İnsanlarda da zehirlenme belirtileri göstereceğinden dikkatli kullanılması gereken bir drogdur.

© - josef hlasek


www.hlasek.com

Equisetum arvense 4751



***Hyoscyamus niger* (Banotu)**

Batbatotu, Bengildek, Dağdağan, Diş otu, Gavurhaşhaşı



Kullanılan Kısımları ve İçerikleri : Çiçekli halde iken toplanıp gölgede kurutulmuş yaprakları kullanılır.

Kullanım Şekilleri ve Alanları : Toz, tentür, sıvı ekstre, şurup, merhem, uçucu yağ, infüzyon halinde kullanılır. Bitkinin tüm organları zehirlidir ve uyuşturucu özelliği vardır. Bu nedenle dahilen ancak doktor önerisine göre kullanılmalıdır. Önemli semptomları ise baş ağrısı, baş dönmesi, sarhoşluk hali, göz bebeklerinin büyümesi ve vücut sıcaklığının yükselmesi şeklinde hissedilir. Ağrı kesici, uyuşturucu, göz bebeğini büyültücü etkileri vardır. Merhemi haricen romatizma, eklem hastalıkları ve baş ağrılarını giderici, yaprakları sigara gibi içilirse astım krizlerine karşı etkili, şurubu ise parkinson hastalığından ileri gelen ağrıları gidericidir. Haricen, sinir sistemi yatıştırıcısı ve ağrı kesici olarak, dekoksyonu ağrıyan yere sürülme biçiminde kullanılır.





Frangula dodonei

Frangula alnus (Barut Ağacı)

Frangula alnus

Erkek Akdiken, Ala cehri, Cehri, Ciğar, Ciğarı




**BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİ GENELİNDE
SARMAŞIK-BARUT AĞACI-ŞERBETÇİ OTU DAĞILIMINI GÖSTEREN HARİTA**



Genç gövde ve kalınca dalların kabukları kullanılır.





Toz, hap ve dekoksasyon halinde kullanılır. Müshil ve midevi etkilere sahiptir. Kabuk, yapraklar ve meyve zehirli olup, en çok zehir taze haldeki kabukta bulunur. Etkisi kuvvetli ishal, şiddetli mide ağrısı, bulantı ve kusma şeklinde kendini gösterir. Çok eski çağlardan beri kabızlığı giderici ilaç olarak kullanılmış ve günümüzde de kullanılmaktadır.

Ayrıca **sarılık** tedavisinde standart hap haline getirilmiştir.

Kabuktan sarı boya, olgunlaşmamış meyvelerinden ise yeşil bir boya elde edilir. Taze kabukları zehirli olduğundan iyice kurutulmuş (1 yıllık) halde kullanılması önerilmektedir. Kabuğu alınmış dallar fasulye sırığı olarak değerlendirilir.

PHOTOGRAPHERS
DIRECT.COM

