

ODUN DIŐI ORMAN ÜRÜNLERİ



ROSA CANINA (KUŞBURNU)



Kullanılan kısımları

Meyveler



Taç Yapraklar

Meyveler;

C vitamini bakımından oldukça zengindir.

**Reçel, marmelad, meyve suyu, ay
retiminde kullanılır.**



**Süslemelerde de
kullanılmaktadır.**



Taç yapraklar boya ve tanen maddeleri içerir.

Boya ve deri sanayinde değerlendirilir.

Parfümeri sanayisinin temel hammaddelerindendir.

Eczacılıkta bazı hapların dış şekerli kısımlarının içeriğinde kullanılır.

Kuvvetlendirici etkisi vardır.



Değerli meyvelerinin ve kuvvetli kök sisteminin olması, yol stabilizasyon çalışmalarında tercih edilmesine neden olmaktadır.



ROBINIA PSEUDOACACIA

(Yalancı Akasya)



Kullanılan kısımları kabuk, yaprak ve çiçekleridir.

Kabuk ve yapraklar kusturucu, safra akışını düzenleyici,

Çiçekleri kabızlığı giderici, kasılmayı önleyici etki yapar.

Toz, infüzyon ve tıbbi şarap olarak kullanılır.

Fazla alınırsa hafif zehirlenme yapar.





beehoney.en.alibaba.com



Çiçekleri arıcılıkta kullanılır, parfümeri sanayinde aranan pahalı bir maddedir.

**Kuvvetli kök sistemi olması,
köklerinde azot bağlayan
bakteriler olması, çiçeklerinin
arıcılıkta kullanılması
sebepleriyle ağaçlandırma
çalışmalarında
kullanılmaktadır.**



GLYCYRRHIZA GLABRA
(Meyan Kökü ve Özü)





**Kullanılan kısımları
kök ve rizomlarıdır.**



Glycyrrhizin maddesi şekerden 50 kez daha tatlıdır.



**Kişniş maddesi ile
karıştırılarak kola gibi
içeceklerin imalinde
kullanılır**



Enerji verici, düşük tansiyonu yükseltici, göğsü yumuşatıcı, terlemeye karşı etkileri vardır.



Eczacılıkta tabletlerin hazırlanmasında ve tad değıştirici,

Tıpta idrar söktürücü, taş düşürücü ve mide ülserine karşı yararlanılmaktadır.

Şekerleme ve helva yapımında da kullanılmaktadır.



ASTRAGALUS SPP.

(Geven-Kitre)



Kitre, Geven türlerinden doğal olarak sızan ya da kabuğun çizilerek sızdırılan zamkın, hava etkisiyle kuruyup sertleşmesi haline denir. Yaprak kitre ve Firde olmak üzere iki tiptir.



Gövdeye yapılan yaralanmalar sonucu elde edilir. Piyasadaki kaliteli kitredir.

Firde ise tane, çubuk ve ince şeritler halindedir. Gövde ve dallarda meydana gelen delik veya çatlaklardan sızan zamktan elde edilir.





**Kumař ve kağıt
endüstrisinde yapıştırıcı
olarak kullanılmakta ve
aprelemede
yararlanılmaktadır**





Çok eski yıllardan beri bilinen en eski ilaç hammaddelerindendir.

ERICA ARBOREA (FUNDA)



- Ağaç Fundası'nın yan ürün olarak kullanılan kısımları çiçekli dal uçları, kökleri ve ince dallarıdır.
- Çiçekli dal uçlarından elde edilen %5'lik infüzyon idrar yolları taşlarını düşürmek amacıyla kullanılan bazı ilaçların bileşiminde yer almaktadır. Terletici ve balgam söktürücü olarak ta kullanılır
- Genç yaprakları salataya sarımsak kokusu vermek için harç olarak katılmaktadır.



Odunları yanmaya karşı dayanıklı olduđundan, dñnyaca ñnlñ Bruyere pipolarının yapımında kullanılmaktadır.



Ayrıca dallarından süpürge, köklerinden pipo ağızlığı yapılmaktadır.



ORCHIS SPP. (SALEP)



Salep elde edilen türler; *Orchis laxiflora*, *O. palustris*, *O. anatolica*, *O. mascula*, *O. maculata*, *O. morina*







Orchis anatolica



Orchis morio



Anacamptis pyramidalis



Dactylorhiza osmanica



Orphys holoserica



Himantoglossum affine

Salep unu sıcak suda geniřleme zelliđine sahiptir. 1 kahve kařıđı salep unu, 1 litre sıcak suyu st yođunluđuna getirebilir.





Salebin dinlendirici, ferahlatıcı, besleyici özellikleri vardır. Soğuk algınlıklarında göğüs yumuşatıcı ve öksürük kesici olarak kullanılır.









